

**Acute Care - Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)**

**Client:**

		Date de l'évaluation					
Item	Score Acute Care (1)	Score					
Continence fécale	H3 (BCD) = 0,1,2,8	0					
	H3 (BCD) = 3,4,5	1					
Mobilité au lit	G1f (BCD) = 0,1,2,3	0					
	G1f (BCD) = 4,5,6,8	1					
Marcher	G1c (BCD) = 0,1,2,3	0					
	G1c (BCD) = 4,5,6,8	1					
Problèmes nutritionnels	K2 (B) = 0	0					
	K2 (B) = 1	1					
Antécédents d'ulcère de pression	L2 (A) = 0	0					
	L2 (A) = 1	2					
Fréquence de la douleur	J6a (BCD) = 0,1	0					
	J6a (BCD) = 2	1					
Dyspnée	J4 (BCD) = 0	0					
	J4 (BCD) = 1,2,3	1					
Total			/8	/8	/8	/8	/8
Catégories de risque*							
Initiales de l'évaluateur							
*Catégories de risque							
Score total	Catégories de risque						
0	Risque très faible						
1 ou 2	Risque faible						
3	Risque modéré						
4 ou 5	Risque élevé						
6, 7, ou 8	Risque très élevé						

## **(1) Score Acute Care**

*Cette échelle peut être calculée à 3 moments d'évaluation: admission (B), réévaluation (C) et sortie (D). Pour chacun des trois moments d'évaluation K2 est utilisé à l'admission (B) et L2 est utilisé lors de l'évaluation pré-morbide (A).*

### **BelRAI - Acute Care H3. Continence fécale**

Coder la continence pour les 3 derniers jours:

- 0. Continent(e) - Contrôle complet (absence de stomie).
- 1. Contrôle avec stomie - Durant les trois derniers jours/24 dernières heures.
- 2. Rarement incontinent(e) – Continent(e) durant les 3 derniers jours/24 dernières heures mais a des épisodes d'incontinence.
- 3. Occasionnellement incontinent(e) - Moins que quotidiennement (ce code n'est pas valable pour la période d'admission).
- 4. Fréquemment incontinent(e) - Quotidiennement avec cependant persistance d'un contrôle.
- 5. Incontinent(e) – Absence totale de contrôle.
- 8. N'est pas survenue - Aucune émission de selles durant les 3 derniers jours/24 dernières heures.

### **BelRAI - Acute Care G1f. Mobilité au lit**

Comment la personne se couche et se relève de la position couchée, se redresse, s'étend, se tourne et s'installe en bonne position lorsqu'elle est au lit.

Coder:

- 0. Autonome – Ni préparation, ni supervision, ni assistance physique lors de tout épisode
- 1. Aide à la préparation uniquement – Article procuré ou placé à proximité sans supervision ou assistance physique
- 2. Supervision – Surveillance ou indications
- 3. Assistance limitée – Aide pour la mobilisation des membres OU guidance physique ne nécessitant pas de force
- 4. Assistance importante – Aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par un seul aidant alors que la personne accomplit encore minimum 50% ou + de l'activité
- 5. Assistance maximale – Aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par minimum 2 aidants OU aide nécessitant de la force physique pour plus de 50% de l'activité
- 6. Dépendance totale – Activité entièrement accomplie par d'autres durant l'ensemble de la période
- 8. L'activité n'a pas été accomplie

### **BelRAI - Acute Care G1c. Marcher**

Comment la personne marche entre deux points du même étage.

Coder:

- 0. Autonome – Ni préparation, ni supervision, ni assistance physique lors de tout épisode
- 1. Aide à la préparation uniquement – Article procuré ou placé à proximité sans supervision ou assistance physique
- 2. Supervision – Surveillance ou indications
- 3. Assistance limitée – Aide pour la mobilisation des membres OU guidance physique ne nécessitant pas de force
- 4. Assistance importante – Aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par un seul aidant alors que la personne accomplit encore minimum 50% ou + de l'activité
- 5. Assistance maximale – Aide nécessitant de la force (y compris soulever les membres) par minimum 2 aidants OU aide nécessitant de la force physique pour plus de 50% de l'activité
- 6. Dépendance totale – Activité entièrement accomplie par d'autres durant l'ensemble de la période
- 8. L'activité n'a pas été accomplie

### **BelRAI - Acute Care K2. Problèmes nutritionnels**

Perte de poids de 5% ou plus au cours des 30 derniers jours ou de 10% ou plus au cours des 180 derniers jours.

Coder:

- 0. Non
- 1. Oui

### **BelRAI - Acute Care L2. Antécédents d'ulcère de pression**

Déterminer les antécédents d'ulcère de pression

Coder:

- 0. Non
- 1. Oui

Info: "L1. Stade le plus sévère d'ulcère de pression": score 0 = pas d'ulcère de pression en scores 1-5 = différents stades de gravité.

### **BelRAI - Acute Care J6a. Fréquence à laquelle la personne se plaint ou manifeste des signes de douleur**

Inclut grimaces, serrement de dents, gémissement, retrait lors d'un contact ou d'autres manifestations non verbales suggérant la douleur.

Coder la présence ou l'absence du problème dans les 3 derniers jours:

- 0. Pas de douleur
- 1. Symptômes présents mais non manifestés durant les 3 derniers jours/24 dernières heures
- 2. Présents ces 3 derniers jours/24 dernières heures

### **BelRAI - Acute Care J4. Dyspnée**

Décrire la présence et le degré de sévérité de dyspnée.

Coder le degré le plus élevé dans les 3 derniers jours.

Si aucun essoufflement n'es survenu durant les 3 derniers jours car le client n'a pas effectué d'activités, coder selon les activités que le client effectue normalement:

- 0. Absente
- 1. Absente au repos mais présente lors d'activités modérées
- 2. Absence au repos mais présente lors des activités habituelles de la vie quotidienne
- 3. Présente au repos