

RESUME DES RESULTATS PAR ECHELLE

ADL Hierarchy Scale (ADLH)	<p>7 niveaux allant de 0 à 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = indépendant pour les 4 fonctions AVQ • 1 = supervision pour au moins une fonction AVQ (et moins qu'assistance partielle ou limitée pour les 4 fonctions AVQ) • 2 = assistance limitée pour minimum une des 4 fonctions AVQ (et moins qu'assistance étendue pour les 4 fonctions AVQ) • 3 = assistance importante exigée pour au moins l'hygiène personnelle et l'utilisation des toilettes (et moins qu'assistance étendue exigée pour l'alimentation et le déplacement) • 4 = assistance importante exigée pour l'alimentation et le déplacement (pas de dépendance totale pour l'alimentation et/ou pour le déplacement) • 5 = dépendance totale pour l'alimentation et/ou pour le déplacement • 6 = dépendance totale pour les 4 fonctions AVQ
Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs Scale (CHESS)	<p>6 scores de 0 à 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = état de santé stable • 1 = instabilité légère de l'état de santé • 2 = instabilité modérée de l'état de santé • 3 = instabilité élevée de l'état de santé • 4 = instabilité très élevée de l'état de santé • 5 = instabilité sévère de l'état de santé
Communication Scale	<p>9 scores allant de 0 à 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = intact • 1 = quasi intact • 2 = déclin léger • 3 = déclin léger à modéré • 4 = déclin modéré • 5 = déclin modéré à important • 6 = déclin important • 7 = déclin important à très important • 8 = déclin très important
Cognitive Performance Scales (CPS)	<p>7 niveaux allant de 0 à 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = intact • 1 = intact borderline • 2 = déclin léger • 3 = déclin modéré • 4 = déclin modéré à important • 5 = déclin important • 6 = déclin très important
Depression Rating Scale (DRS)	<p>Plus le score est élevé (à partir de 3 sur une échelle de</p>

	0 à 14), plus il est probable qu'un trouble dépressif soit potentiellement présent (pour l'Acute Care, 0-6).
IADL Scales (P & C)	Les scores (de 0 à 48) reflètent les difficultés croissantes de la personne en ce qui concerne son fonctionnement, à savoir l'accomplissement réel des activités AIVQ et la possibilité de les effectuer.
Method for Assigning Priority Levels (MAPLe)	5 niveaux de priorité allant de 1 à 5: <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Besoin bas (Low need) • 2 = Besoin moyen (Mild need) • 3 = Besoin modéré (Moderate need) • 4 = Besoin élevé (High need) • 5 = Besoin très élevé (Very high need)
Pain Scale	5 scores allant de 0 à 4: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = pas de douleur • 1 = douleur moins que journalière • 2 = douleur journalière modérée • 3 = douleur journalière sévère • 4 = douleur journalière atroce ou insupportable
Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)	5 catégories de risque allant de 0 à 8: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = risque très faible • 1 ou 2 = risque faible • 3 = risque modéré • 4 ou 5 = risque élevé • 6, 7 ou 8 = risque très élevé