

Bijlage 1: Onderscheid depressie, delirium, dementie

<i>Kenmerk</i>	<i>Depressie</i>	<i>Delirium</i>	<i>Dementie</i>
<i>Begin</i>	Variabel, geleidelijk	Acuut (uren tot dagen)	Sluipend (maanden tot jaren)
<i>Verloop</i>	Dagschommelingen, vooral 's morgens symptomen	Symptomen fluctueren, toename 's nachts	Relatief stabiel, na lange tijd waar te nemen achteruitgang
<i>Duur</i>	Ten minste zes weken, maanden tot jaren	Uren tot dagen, minder dan een maand	Maanden tot jaren
<i>Bewustzijn</i>	Bewustzijn en alertheid normaal	Gedaald bewustzijn, fluctuerende alertheid	In beginstadium: bewustzijn en alertheid normaal
<i>Aandacht</i>	Aandacht zwakker, interesseverlies of negatieve gedachtegang	Gestoord, fluctuerend	In beginstadium: normaal
<i>Oriëntatie</i>	Niet gestoord	Gestoord	Gestoord
<i>Geheugen</i>	Geheugen intact	Verstoord kortetermijngeheugen	Verstoord korte- en langetermijngeheugen
<i>Gedachtegang</i>	Intact, maar gevoelens van minderwaardigheid, hopeloosheid of hulpeloosheid	Gefragmenteerd, gedesoriënteerd	Moeilijkheden met abstract denken, verarmde gedachten, woordvindingsproblemen
<i>Hallucinaties en wanen</i>	Bij klein aantal patiënten aanwezig	Doorgaans aanwezig: visuele meer dan auditieve	Doorgaans afwezig in beginstadia. Wel vaak paranoïde wanen
<i>Slaap-waakcyclus</i>	Verstoord, vroegtijdig ontwaken, overmatig slapen	Verstoord	Gefragmenteerde slaap

Boek: Probleemgeoriënteerd denken in de geriatrie.