

## BEKNOPTE WEERGAVE RESULTATEN SCALES

<b>ADL Hierarchy Scale (ADLH)</b>	<p>7 niveaus van 0 tot 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = zelfstandig bij de 4 ADL-functies</li> <li>• 1 = tenminste toezicht bij één ADL-functie (en minder dan beperkte hulp bij alle 4 ADL-functies)</li> <li>• 2 = beperkte hulp vereist bij 1 of meer van de 4 ADL-functies (en minder dan uitgebreide hulp bij alle 4 ADL-functies)</li> <li>• 3 = tenminste uitgebreide hulp vereist bij de persoonlijke hygiëne en het toiletgebruik (en minder dan uitgebreide hulp vereist bij het eten en het zich verplaatsen)</li> <li>• 4 = uitgebreide hulp vereist bij het eten of het zich verplaatsen (geen totale afhankelijkheid bij het eten en het zich verplaatsen)</li> <li>• 5 = totale afhankelijkheid bij het eten en/of het zich verplaatsen</li> <li>• 6 = totale afhankelijkheid bij de 4 ADL-functies</li> </ul>
<b>Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs Scale (CHESS)</b>	<p>6 scores van 0 tot 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = helemaal niet onstabiel</li> <li>• 5 = volledig onstabiel</li> </ul>
<b>Communication Scale</b>	<p>9 scores van 0 tot 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = intact</li> <li>• 1 = borderline intact</li> <li>• 2 = licht verstoord</li> <li>• 3 = licht tot matig verstoord</li> <li>• 4 = matig verstoord</li> <li>• 5 = matig tot ernstig verstoord</li> <li>• 6 = ernstig verstoord</li> <li>• 7 = ernstig tot zeer ernstig verstoord</li> <li>• 8 = zeer ernstig verstoord</li> </ul>
<b>Cognitive Performance Scales (CPS)</b>	<p>7 niveaus van 0 tot 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = intact</li> <li>• 1 = borderline intact</li> <li>• 2 = licht verstoord</li> <li>• 3 = matig verstoord</li> <li>• 4 = matig ernstig verstoord</li> <li>• 5 = ernstig verstoord</li> <li>• 6 = zeer ernstig verstoord</li> </ul>
<b>Depression Rating Scale (DRS)</b>	<p>Hoe hoger de score (vanaf 3 of meer in een bereik van 0-14) hoe waarschijnlijker de aanwezigheid van een depressiestoornis.</p>
<b>IADL Scales</b>	<p>Een hogere score (in een bereik van 0-48) duidt op toenemende moeilijkheden bij het effectief uitvoeren en bij de mogelijkheden om de betrokken IADL-functies uit te voeren.</p>

<b>Method for Assigning Priority Levels (MAPLe)</b>	5 prioriteitsniveaus van 1 tot 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = lage behoefte</li> <li>• 2 = lichte behoefte</li> <li>• 3 = matige behoefte</li> <li>• 4 = hoge behoefte</li> <li>• 5 = zeer hoge behoefte</li> </ul>
<b>Pain Scale</b>	5 scores van 0 tot 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = geen pijn</li> <li>• 1 = minder dan dagelijks pijn</li> <li>• 2 = dagelijks matige pijn</li> <li>• 3 = dagelijks ernstige pijn</li> <li>• 4 = dagelijks vreselijke of ondraaglijke pijn</li> </ul>
<b>Pressure Ulcer Risk Scale (PURS)</b>	5 risicocategorieën in een bereik van 0 tot 8: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = zeer laag risico</li> <li>• 1 of 2 = laag risico</li> <li>• 3 = matig risico</li> <li>• 4 of 5 = hoog risico</li> <li>• 6, 7 of 8 = zeer hoog risico</li> </ul>