

## CAP-TRIGGERS

### Inhoudsopgave

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Functioneel presteren .....                                     | 3  |
| 1.1   | Bevordering van de lichaamsbeweging.....                        | 3  |
| 1.1.1 | Home Care.....  | 3  |
| 1.1.2 | LTCF .....  | 3  |
| 1.2   | Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL) ..... | 3  |
| 1.2.1 | Home Care.....  | 3  |
| 1.2.2 | LTCF .....  | 4  |
| 1.3   | Activiteiten van het dagelijks leven (ADL) .....                | 4  |
| 1.3.1 | Home Care.....  | 4  |
| 1.3.2 | LTCF .....  | 4  |
| 1.4   | Thuisomgeving.....  | 5  |
| 1.4.1 | Home Care.....  | 5  |
| 1.4.2 | LTCF .....  | 5  |
| 1.5   | Kans op opname in een instelling .....                          | 5  |
| 1.5.1 | Home Care.....  | 5  |
| 1.5.2 | LTCF .....  | 6  |
| 1.6   | Fysieke fixatie .....   | 6  |
| 1.6.1 | Home Care.....  | 6  |
| 1.6.2 | LTCF .....  | 6  |
| 2     | Cognitie en geestelijke gezondheid.....                         | 7  |
| 2.1   | Cognitieverlies .....   | 7  |
| 2.1.1 | Home Care.....  | 7  |
| 2.1.2 | LTCF .....  | 7  |
| 2.2   | Delirium .....  | 8  |
| 2.2.1 | Home Care.....  | 8  |
| 2.2.2 | LTCF .....  | 8  |
| 2.3   | Communicatie .....  | 8  |
| 2.3.1 | Home Care.....  | 8  |
| 2.3.2 | LTCF .....  | 8  |
| 2.4   | Stemmingsstoornissen.....                                       | 8  |
| 2.4.1 | Home Care.....  | 9  |
| 2.4.2 | LTCF .....  | 9  |
| 2.5   | Gedrag .....  | 9  |
| 2.5.1 | Home Care.....  | 9  |
| 2.5.2 | LTCF .....  | 9  |
| 2.6   | Mishandeling.....   | 9  |
| 2.6.1 | Home Care.....  | 9  |
| 2.6.2 | LTCF .....  | 10 |
| 3     | Sociaal leven .....   | 10 |
| 3.1   | Activiteiten.....   | 10 |
| 3.1.1 | Home Care.....  | 10 |
| 3.1.2 | LTCF .....  | 10 |
| 3.2   | Mantelzorg .....  | 10 |
| 3.2.1 | Home Care.....  | 11 |
| 3.2.2 | LTCF .....  | 11 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 3.3    | Sociale omgang .....                       | 11 |
| 3.3.1  | Home Care.....                             | 11 |
| 3.3.2  | LTCF .....                                 | 11 |
| 4      | Klinische complicaties .....               | 12 |
| 4.1    | Valincidenten .....                        | 12 |
| 4.1.1  | Home Care.....                             | 12 |
| 4.1.2  | LTCF .....                                 | 12 |
| 4.2    | Pijn .....                                 | 12 |
| 4.2.1  | Home Care.....                             | 12 |
| 4.2.2  | LTCF .....                                 | 12 |
| 4.3    | Decubitus.....                             | 12 |
| 4.3.1  | Home Care.....                             | 12 |
| 4.3.2  | LTCF .....                                 | 13 |
| 4.4    | Hart en ademhaling .....                   | 13 |
| 4.4.1  | Home Care.....                             | 13 |
| 4.4.2  | LTCF .....                                 | 13 |
| 4.5    | Ondervoeding.....                          | 13 |
| 4.5.1  | Home Care.....                             | 13 |
| 4.5.2  | LTCF .....                                 | 14 |
| 4.6    | Dehydratatie .....                         | 14 |
| 4.6.1  | Home Care.....                             | 14 |
| 4.6.2  | LTCF .....                                 | 14 |
| 4.7    | Sondevoeding .....                         | 14 |
| 4.7.1  | Home Care.....                             | 14 |
| 4.7.2  | LTCF .....                                 | 14 |
| 4.8    | Juist en verantwoord medicatiegebruik..... | 15 |
| 4.8.1  | Home Care.....                             | 15 |
| 4.8.2  | LTCF .....                                 | 15 |
| 4.9    | Tabak- en alcoholgebruik.....              | 15 |
| 4.9.1  | Home Care.....                             | 15 |
| 4.9.2  | LTCF .....                                 | 15 |
| 4.10   | Urine-incontinentie.....                   | 15 |
| 4.10.1 | Home Care.....                             | 16 |
| 4.10.2 | LTCF .....                                 | 16 |
| 4.11   | Fecale incontinentie.....                  | 16 |
| 4.11.1 | Home Care.....                             | 16 |
| 4.11.2 | LTCF .....                                 | 17 |

# 1 Functioneel presteren

## 1.1 Bevordering van de lichaamsbeweging

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 1.1.1 Home Care

|      |   |
|------|---|
| G1fA | Trappen <b>UITVOERING</b>   |
| G2f  | Zich verplaatsen  |
| G4a  | Minder dan 2 uren lichamelijke activiteit of oefening in de laatste 3 dagen                                 |
| G5a  | De cliënt denkt in staat te zijn tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren                |
| G5b  | De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren |

### 1.1.2 LTCF

|     |   |
|-----|---|
| G1f | Zich verplaatsen  |
| G3a | Totaal aantal uur lichamelijke activiteit of oefening in de laatste 3 dagen                                 |
| G4a | De cliënt denkt in staat te zijn tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren                |
| G4b | De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren |

## 1.2 Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL)

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 1.2.1 Home Care

|      |   |
|------|---|
| G1aB | Maaltijdbereiding <b>MOGELIJKHEDEN</b>  |
| G1bB | Huishoudelijk werk <b>MOGELIJKHEDEN</b>   |
| G1gB | Boodschappen <b>MOGELIJKHEDEN</b>   |
| G1hB | Vervoer <b>MOGELIJKHEDEN</b>  |
| G5a  | De cliënt denkt in staat te zijn tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren                |
| G5b  | De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren |
| G6   | ADL-toestand in vergelijking met 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)                  |
| ADLH | ADL Hierarchy scale   |
| CPS  | Cognitive Performance Scale   |

### 1.2.2 LTCF

|               |
|---------------|
| Niet aanwezig |
|---------------|

## 1.3 Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 1.3.1 Home Care

|      |  |
|------|--|
| C3a  | Gemakkelijk afgeleid   |
| C3c  | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag  |
| C4   | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren                            |
| C5   | Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)           |
| G6   | ADL-toestand in vergelijking met 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)                       |
| I1a  | Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)                                     |
| I1r  | Longontsteking   |
| J1   | Valincidenten  |
| J7b  | Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem                    |
| J7c  | Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven   |
| N3eA | Kinesitherapie DAGEN   |
| N5a  | In ziekenhuis doorgebrachte nacht(en)  |
| R2   | Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling) |
| ADLH | ADL Hierarchy  |
| CPS  | Cognitive Performance Scale  |

### 1.3.2 LTCF

|     |  |
|-----|--|
| C3a | Gemakkelijk afgeleid   |
| C3c | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag  |
| C4  | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren                  |
| C5  | Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling) |
| G5  | ADL-toestand in vergelijking met 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)             |
| I1a | Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)                           |
| I1r | Longontsteking   |

|      |   |
|------|---|
| J1   | Valincidenten   |
| J7b  | Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem |
| J7c  | Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven                                    |
| O3aB | Kinesitherapie DAGEN  |
| O4a  | In ziekenhuis doorgebrachte nacht(en)   |
| ADLH | ADL Hierarchy   |
| CPS  | Cognitive Performance Scale   |

## 1.4 Thuisomgeving

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 1.4.1 Home Care

|      |   |
|------|---|
| G1fB | Trappen MOGELIJKHEDEN   |
| G4a  | Totaal aantal uur lichamelijke activiteit of oefening in de laatste 3 dagen |
| J3d  | Onzekere pas  |
| J3g  | Abnormaal gedachteproces  |
| J3h  | Wanen   |
| J3i  | Hallucinaties   |
| J7a  | Door problemen/ziekten zijn cognitie, ADL, stemming of gedrag onstabiel     |
| J8   | Zelfgemelde gezondheid  |
| Q1a  | Achterstallig onderhoud   |
| Q1b  | Smerige woon- en leefomstandigheden   |
| Q1c  | Onvoldoende verwarming of koeling   |
| Q1e  | Beperkte of gebrekkige toegang tot de woning of de woonvertrekken           |
| DRS  | Depression Rating Scale   |

### 1.4.2 LTCF

|               |
|---------------|
| Niet aanwezig |
|---------------|

## 1.5 Kans op opname in een instelling

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 1.5.1 Home Care

|     |   |
|-----|---|
| B3a | Bejaardentehuis, rust- en verzorgingstehuis, woon- en zorgcentrum |
| C1  | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming            |

|     |  |
|-----|--|
| C2a | Kortetermijngeheugen   |
| D1  | Uiting - Zichzelf duidelijk maken  |
| D2  | Begrip – Anderen kunnen begrijpen  |
| E3a | Zwerfgedrag  |
| E3b | Verbaal lastigvallen   |
| E3c | Lichamelijk lastigvallen   |
| E3d | Sociaal ongepast of storend gedrag   |
| E3e | Ongepast openlijk seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden                        |
| E3f | Verzet zich tegen zorg   |
| G2b | Persoonlijke hygiëne   |
| G2f | Zich verplaatsen   |
| G2g | Toilettransfer   |
| G3a | Voornaamste manier van verplaatsen binnenshuis   |
| G4b | Aantal dagen waarop de cliënt naar buiten ging in de laatste 3 dagen, hoe kort ook         |
| G6  | ADL-toestand in vergelijking met 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna) |
| H1  | Urinecontinentie   |
| I1c | Ziekte van Alzheimer   |
| J1  | Valincidenten  |

### 1.5.2 LTCF

|               |
|---------------|
| Niet aanwezig |
|---------------|

## 1.6 Fysieke fixatie

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 1.6.1 Home Care

|      |  |
|------|--|
| C1   | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming |
| I1i  | Quadriplegie   |
| N4b  | Bovenlichaamfixatie                                    |
| N4c  | Stoel waaruit de cliënt niet kan opstaan               |
| ADLH | ADL Hierarchy  |

### 1.6.2 LTCF

|      |  |
|------|--|
| C1   | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming |
| I1i  | Quadriplegie   |
| O7b  | Bovenlichaamfixatie                                    |
| O7c  | Stoel waaruit de cliënt niet kan opstaan               |
| ADLH | ADL Hierarchy  |

## 2 Cognitie en geestelijke gezondheid

### 2.1 Cognitieverlies

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 2.1.1 Home Care

|     |  |
|-----|--|
| C3a | Gemakkelijk afgeleid   |
| C3b | Episodes van onsamenhangend praten   |
| C3c | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag  |
| C4  | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren                            |
| C5  | Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)           |
| D1  | Uiting - Zichzelf duidelijk maken  |
| D2  | Begrip – Anderen kunnen begrijpen  |
| E1e | Herhaaldelijk angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)                                    |
| E1h | Herhaaldelijk zeggen dat er iets vreselijks zal gebeuren   |
| E3a | Zwerfgedrag  |
| E3c | Lichamelijk lastigvallen   |
| I1c | Ziekte van Alzheimer   |
| I1d | Dementie anders dan de ziekte van Alzheimer  |
| J7c | Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven   |
| R2  | Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling) |
| CPS | Cognitive Performance Scale  |

#### 2.1.2 LTCF

|     |  |
|-----|--|
| C3a | Gemakkelijk afgeleid   |
| C3b | Episodes van onsamenhangend praten   |
| C3c | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag  |
| C4  | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functionere                   |
| C5  | Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling) |
| D1  | Uiting - Zichzelf duidelijk maken  |
| D2  | Begrip – Anderen kunnen begrijpen  |
| E1e | Herhaaldelijk angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)                          |
| E1h | Herhaaldelijk zeggen dat er iets vreselijks zal gebeuren   |
| E3a | Zwerfgedrag  |
| E3c | Lichamelijk lastigvallen   |

|     |  |
|-----|--|
| I1c | Ziekte van Alzheimer                                       |
| I1d | Dementie anders dan de ziekte van Alzheimer                |
| J7c | Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven |
| CPS | Cognitive Performance Scale                                |

## 2.2 Delirium

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 2.2.1 Home Care

|     |   |
|-----|---|
| C3a | Gemakkelijk afgeleid  |
| C3b | Episodes van onsamenhangend praten  |
| C3c | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag                                 |
| C4  | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren |

### 2.2.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

## 2.3 Communicatie

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 2.3.1 Home Care

|    |  |
|----|--|
| C1 | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming |
| D1 | Uiting - Zichzelf duidelijk maken                      |
| D2 | Begrip – Anderen kunnen begrijpen                      |

### 2.3.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

## 2.4 Stemningsstoornissen

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 2.4.1 Home Care

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| DRS | Depression Rating Scale |
|-----|-------------------------|

#### 2.4.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

### 2.5 Gedrag

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 2.5.1 Home Care

|     |   |
|-----|---|
| E3a | Zwerfgedrag   |
| E3b | Verbaal lastigvallen  |
| E3c | Lichamelijk lastigvallen  |
| E3d | Sociaal ongepast of storend gedrag                                  |
| E3e | Ongepast openlijk seksueel gedrag of zich in het openbaar uitkleden |
| E3f | Verzet zich tegen zorg  |

#### 2.5.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

### 2.6 Mishandeling

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 2.6.1 Home Care

|      |  |
|------|--|
| A13c | Clïent of familielid denkt dat de cliënt beter af zou zijn in ander woonverblijf |
| E1i  | Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten                                   |
| E1j  | Verminderde sociale omgang   |
| F1d  | Uit openlijk ruzie of woede met familie of vrienden                              |
| F1e  | Is bang voor familielid of goede bekende   |
| F1f  | Verwaarloosd, misbruikt of mishandeld  |

|      |  |
|------|--|
| F2   | Eenzaam  |
| J3t  | Hygiëne  |
| J7a  | Door problemen/ziekten zijn cognitie, ADL, stemming of gedrag onstabiel                      |
| J8   | Zelfgemelde gezondheid   |
| K2a  | Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen |
| K2c  | Minder dan 1 liter vochtinname per dag (minder dan 6-8 kopjes per dag)                       |
| M3   | Houding van de cliënt ten opzichte van voorgeschreven geneesmiddelen                         |
| P3b1 | Uit droefheid, woede of depressie MANTELZORGER 1   |
| BMI  | Body Mass Index  |
| DRS  | Depression Rating Scale  |

### 2.6.2 LTCF

|               |
|---------------|
| Niet aanwezig |
|---------------|

## 3 Sociaal leven

### 3.1 Activiteiten

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 3.1.1 Home Care

|               |
|---------------|
| Niet aanwezig |
|---------------|

#### 3.1.2 LTCF

|     |  |
|-----|--|
| C1  | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming |
| E1i | Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten         |
| E1j | Verminderde sociale omgang                             |
| F2a | Op gemak in omgang met anderen                         |
| F2b | Op gemak bij geplande of gestructureerde activiteiten  |
| F2e | Zoekt contact met andere(n)                            |
| M1  | Tijd gemiddeld bezig met ontspanningsactiviteiten      |

### 3.2 Mantelzorg

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 3.2.1 Home Care

|      |   |
|------|---|
| A13a | Woont                                       |
| F4   | Overdag alleen ('s morgens en 's namiddags) |
| G1aB | Maaltijdbereiding MOGELIJKHEDEN             |
| G1bB | Huishoudelijk werk MOGELIJKHEDEN            |
| G1gB | Boodschappen MOGELIJKHEDEN                  |
| G1hB | Vervoer MOGELIJKHEDEN                       |
| P1a  | Aanwezigheid van mantelzorger(s)            |

### 3.2.2 LTCF

|               |
|---------------|
| Niet aanwezig |
|---------------|

## 3.3 Sociale omgang

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 3.3.1 Home Care

|     |   |
|-----|---|
| D2  | Begrip – Anderen kunnen begrijpen   |
| F2  | Eenzaam   |
| F3  | Verandering in sociale activiteiten in de laatste 90 dagen (of sinds laatste beoordeling) |
| F4  | Overdag alleen (ochtend en namiddag)  |
| CPS | Cognitive Performance Scale   |

### 3.3.2 LTCF

|     |  |
|-----|--|
| D2  | Begrip - Anderen kunnen begrijpen        |
| F2d | Zoekt betrokkenheid in de instelling     |
| F3e | Zegt of geeft aan zich eenzaam te voelen |
| CPS | Cognitive Performance Scale              |

## 4 Klinische complicaties

### 4.1 Valincidenten

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.1.1 Home Care

|    |               |
|----|---------------|
| J1 | Valincidenten |
|----|---------------|

#### 4.1.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

### 4.2 Pijn

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.2.1 Home Care

|     |   |
|-----|---|
| J6a | Frequentie waarmee over pijn wordt geklaagd of pijn wordt getoond |
| J6b | Intensiteit van de ergste pijn                                    |

#### 4.2.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

### 4.3 Decubitus

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.3.1 Home Care

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| G2g | Toilettransfer        |
| G2i | Beweeglijkheid in bed |
| H1  | Urinecontinentie      |
| H2  | Urine-opvangsysteem   |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| L1  | Doorligwonde met hoogste ernstgraad |
| L2  | Eerder een doorligwonde gehad       |
| L3  | Ulcus cruris                        |
| N2k | Wondzorg                            |

#### 4.3.2 LTCF

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| G1g | Toilettransfer                      |
| G1i | Beweeglijkheid in bed               |
| H1  | Urinecontinentie                    |
| H2  | Urine-opvangsysteem                 |
| L1  | Doorligwonde met hoogste ernstgraad |
| L2  | Eerder een doorligwonde gehad       |
| L3  | Ulcus cruris                        |
| O2k | Wondzorg                            |

### 4.4 Hart en ademhaling

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.4.1 Home Care

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| J3c | Duizeligheid             |
| J3e | Pijn aan de borst        |
| J4  | Dyspneu (Kortademigheid) |

#### 4.4.2 LTCF

|                |  |
|----------------|--|
| Idem Home Care |  |
|----------------|--|

### 4.5 Ondervoeding

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.5.1 Home Care

|     |                 |
|-----|-----------------|
| BMI | Body Mass Index |
|-----|-----------------|

#### 4.5.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

### 4.6 Dehydratatie

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.6.1 Home Care

|     |  |
|-----|--|
| C3a | Gemakkelijk afgeleid   |
| C3b | Episodes van onsamenhangend praten   |
| C3c | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag  |
| C4  | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren        |
| J3c | Duizeligheid   |
| J3l | Constipatie  |
| J3m | Diarree  |
| J3n | Overgeven  |
| J3r | Koorts   |
| K2a | Gewichtsverlies van 5% of meer in de laatste 30 dagen of 10% of meer in de laatste 180 dagen |
| K2b | Gedehydrateerd of verhoogde BUN-waarde   |
| K2c | Minder dan 1 liter vochtinname per dag (minder dan 6-8 kopjes per dag)                       |

#### 4.6.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

### 4.7 Sondevoeding

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.7.1 Home Care

|    |  |
|----|--|
| C1 | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming |
| K3 | Manier van voedselinname                               |

#### 4.7.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

## 4.8 Juist en verantwoord medicatiegebruik

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 4.8.1 Home Care

|     |  |
|-----|--|
| J3c | Duizeligheid   |
| J3e | Pijn in de borststreek   |
| J3u | Perifeer oedeem  |
| J4  | Dyspneu (Kortademigheid)   |
| J8  | Zelfgemelde gezondheid   |
| R2  | Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling) |

### 4.8.2 LTCF

|               |
|---------------|
| Niet aanwezig |
|---------------|

## 4.9 Tabak- en alcoholgebruik

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

### 4.9.1 Home Care

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| J9a | Rookt dagelijks tabak |
| J9b | Alcohol               |

### 4.9.2 LTCF

|                |
|----------------|
| Idem Home Care |
|----------------|

## 4.10 Urine-incontinentie

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.10.1 Home Care

|     |  |
|-----|--|
| C1  | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming                                     |
| G2e | Wandelen   |
| G6  | ADL-toestand in vergelijking met 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna) |
| H1  | Urinecontinentie   |
| H2  | Urine-opvangsysteem  |
| I1a | Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)               |
| I1r | Longontsteking   |
| J3m | Diarree  |
| N2l | Mictie- of blaastraining   |

#### 4.10.2 LTCF

|     |  |
|-----|--|
| C1  | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming                                     |
| G1e | Wandelen   |
| G5  | ADL-toestand in vergelijking met 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna) |
| H1  | Urinecontinentie   |
| H2  | Urine-opvangsysteem  |
| I1a | Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)               |
| I1r | Longontsteking   |
| J3m | Diarree  |
| O2l | Mictie- of blaastraining   |

### 4.11 Fecale incontinentie

Volgende MDS-items moet u **volledig** invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.

#### 4.11.1 Home Care

|     |   |
|-----|---|
| C1  | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming  |
| C3a | Gemakkelijk afgeleid  |
| C3b | Episodes van onsamenhangend praten  |
| C3c | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag   |
| C4  | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren                       |
| G2h | Toiletgebruik   |
| G2i | Beweeglijkheid in bed   |
| G2j | Eten  |
| G5b | De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren |
| H1  | Urinecontinentie  |

|     |  |
|-----|--|
| H3  | Stoelgangcontinentie   |
| I1a | Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)                                     |
| I1r | Longontsteking   |
| R2  | Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling) |

#### 4.11.2 LTCF

|     |   |
|-----|---|
| C1  | Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming  |
| C3a | Gemakkelijk afgeleid  |
| C3b | Episodes van onsamenhangend praten  |
| C3c | Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag   |
| C4  | Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren                       |
| G1h | Toiletgebruik   |
| G1i | Beweeglijkheid in bed   |
| G1j | Eten  |
| G4b | De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren |
| H1  | Urinecontinentie  |
| H3  | Stoelgangcontinentie  |
| I1a | Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)                                |
| I1r | Longontsteking  |