

Tabak- en alcoholgebruik
Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Tabak- en alcoholgebruik-CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

I Betekenis

De **Tabak- en alcoholgebruik-CAP** wordt **niet geactiveerd**. Dit betekent dat deze cliënt **GEEN** van onderstaande eigenschappen vertoont:

- Heeft in de laatste twee weken tijdens één gelegenheid minstens vijf alcoholische drankjes gedronken
- Dagelijkse roker

Bronnen en aanvullende literatuur

- InterRAI CAP's Gebruikershandboek:
 - Burns D.M. *Cigarette smoking among the elderly: disease consequences and the benefits of cessation*. Am J Health Promot 2000; 14(6):357-61.
 - Dale L.C., Olsen D.A., Patten C.A., et al. *Predictors of smoking cessation among elderly smokers treated for nicotine dependence*. Tobacco Control 1997; 6(3):181-7.
 - O'Connell H., Chin A.V., Cunningham C., Lawlor B. *Alcohol use disorders in elderly people - redefining an age old problem in old age*. BMJ 2003; 327(7416):664-7.
 - Prochaska J.O., DiClemente C.C., Norcross J.C. *In search of how people change – Applications to addictive behaviors*. Am Psychol 1992; 47(9): 1102-14.
 - Ranney L., Melvin C., Lux L., McClain E., Lohr K.N. *Systematic review: smoking cessation intervention strategies for adults and adults in special populations*. Ann Intern Med 2006; 145(11):845-56.