

**Urine-incontinentie**  
**Clinical Assessment Protocol (CAP) = 0**

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 0 bij de Urine-incontinentie -CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

## I Betekenis

De **Urine-incontinentie-CAP wordt niet geactiveerd (code 0)**. Dit betekent dat bij deze cliënt geen waarneembaar bewustzijn wordt vastgesteld, of dat hij/zij beschikt over zeer beperkte cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming (cliënt is ernstig gestoord).

In de VS omvat deze groep cliënten ongeveer 15% van de ouderen in een RVT, 11% van de ouderen in de thuiszorg en minder dan 1% van de zelfstandig wonende ouderen. Ongeveer 26% van de ouderen in deze groep die in een RVT verblijven, zal in de loop van een periode van negentig dagen achteruitgaan, terwijl 4% zal verbeteren. Bij ouderen in de thuiszorg zal ongeveer 20% achteruitgang en 8% vooruitgang vertonen.

## Bronnen en aanvullende literatuur

- interRAI CAP's Gebruikershandboek:
  - [www.sign.ac.uk/pdf/sign79.pdf](http://www.sign.ac.uk/pdf/sign79.pdf) SIGN: Scottish Incontinence Guidelines Network - Management of Urinary Incontinence in Primary Care
  - NAFC  
National Association for Continence  
[www.nafc.org](http://www.nafc.org)  
1-800-BLADDER  
1-800-252-3337
  - National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE Guideline 50, Urinary Incontinence, National Collaborating Center for Acute Care, London England, 2007 [www.nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)
  - Urinary Incontinence, Clinical Practice Guideline, AMDA, 2005
  - National Institute of Health, including the AGE Page
  - European Association of Urology  
[www.uroweb.org/publications](http://www.uroweb.org/publications)  
([http://www.uroweb.org/fileadmin/user\\_upload/Guidelines/16percent20incontinence.pdf](http://www.uroweb.org/fileadmin/user_upload/Guidelines/16percent20incontinence.pdf))
  - APTA: Urinary incontinence is not just your grandmother's concern  
[www.apta.org/AM/Template.cfm?Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=21609](http://www.apta.org/AM/Template.cfm?Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=21609)
  - Balmforth J.R., Mantle J., Bidmead J., Cardozo L. *A prospective observational trial of pelvic floor muscle training for female stress urinary incontinence*. BJU Int. 2006 Oct; 98(4):811-7.