

Urine-incontinentie Clinical Assessment Protocol (CAP) = 1

De informatie over deze CAP-code bevindt zich onder:

(1) *Betekenis:* De betekenis van code 1 bij de Urine-incontinentie -CAP.

Deze informatie print u best in zijn geheel uit. De mogelijkheid bestaat om bijkomende literatuur te raadplegen.

I Betekenis

De **Urine-incontinentie-CAP wordt niet geactiveerd (code 1)**. Dit betekent dat deze cliënt urine-continent is of dat hij/zij gebruikt maakt van een katheter of urostoma.

In de VS omvat deze groep ongeveer 35% van de ouderen in een RVT, 55% van de ouderen die thuiszorg krijgen en 92% van de zelfstandig wonende ouderen. Ongeveer 13% van de ouderen in deze groep die in een RVT verblijven, zal in de loop van een periode van negentig dagen achteruitgang vertonen. Bij ouderen in de thuiszorg bedraagt dat percentage ongeveer 11%.

Bronnen en aanvullende literatuur

- interRAI CAP's Gebruikershandboek:
 - www.sign.ac.uk/pdf/sign79.pdf SIGN: Scottish Incontinence Guidelines Network - Management of Urinary Incontinence in Primary Care
 - NAFC
National Association for Continence
www.nafc.org
1-800-BLADDER
1-800-252-3337
 - National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE Guideline 50, Urinary Incontinence, National Collaborating Center for Acute Care, London England, 2007 www.nice.org.uk
 - Urinary Incontinence, Clinical Practice Guideline, AMDA, 2005
 - National Institute of Health, including the AGE Page
 - European Association of Urology
www.uroweb.org/publications
(http://www.uroweb.org/fileadmin/user_upload/Guidelines/16percent20incontinence.pdf)
 - APTA: Urinary incontinence is not just your grandmother's concern
www.apta.org/AM/Template.cfm?Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=21609
 - Balmforth J.R., Mantle J., Bidmead J., Cardozo L. *A prospective observational trial of pelvic floor muscle training for female stress urinary incontinence*. BJU Int. 2006 Oct; 98(4):811-7.